

Прививки детям

Дифтерия



Схема вакцинации

Схема вакцинации:

- V1 – в 3 месяца
- V2 – в 4,5 месяца
- V3 – в 6 месяцев.
- RV1 – в 18 месяцев
- RV2 – в 6-7 лет
- RV3 – в 14 лет*



Тяжелые осложнения дифтерии встречаются часто и связаны с действием дифтерийного экзотоксина. Его «излюбленные» мишени - сердце и нервная система

* В дальнейшем рекомендуется проводить ревакцинацию каждые 10 лет

ДИФТЕРИЯ

это серьезное заболевание, которое вызывается токсинами, вырабатываемыми дифтерийной коринебактерией.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ



Лихорадка



Боль в горле,
шумное
дыхание



Слабость



Серые пленки на
задней
поверхности глотки
и миндалин

**БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ
ДИФТЕРИЯ
ОПАСНА РАЗВИТИЕМ
ОСЛОЖНЕНИЙ:**



Затрудненное
дыхание,
удушьё



Миокардит
(поражение
сердечной
мышцы)



Поражение
нервной
системы



Летальный
исход

**ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ДИФТЕРИИ НЕОБХОДИМА В ТЕЧЕНИЕ
ВСЕЙ ЖИЗНИ!**

Дети: вакцинация трехкратно в 3, 4.5 и 6 месяцев

1-я ревакцинация в 18 месяцев

2-я ревакцинация в 6-7 лет

Подростки: 3-я ревакцинация в 14 лет

Взрослые: подлежат ревакцинации
каждые 10 лет



ВАКЦИНАЦИЯ ЗАЩИТИТ!